

ການເກັບກ່ຽວ

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງກະລໍ່າປີ ຕັ້ງແຕ່ປູກຈົນເຖິງວັນເກັບກ່ຽວ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຜັນ ສໍາລັບຜັນເປົາທີ່ນິຍົມກັນປູກ ຈະມີອາຍຸປະມານ 50-60 ວັນ ແຕ່ຜັນໝັກມີອາຍຸເຖິງ 120 ວັນ ການເກັບກ່ຽວຄວນເລືອກຫົວທີ່ຫໍ່, ຫົວທີ່ແໜ້ນ ແລະ ມີ ຂະໜາດພໍດີ ຄວນໃຊ້ມັດຕັດລໍາຕົ້ນທີ່ມີໃບຫໍ່ຫຸ້ມໄວ້ ປະມານ 2



❖ ຫຼັກການປະຕິບັດກະສິກໍາທີ່ດີ

1. ຜືນທີ່ການຜະລິດຕ້ອງບໍ່ມີຄວາມສຽງ ການປົນເປື້ອນຂອງໂລຫະ ໝັກ, ເຊື້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັ່ນ: ຜືນທີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ ກໍາເກົ່າ, ສາງເຄມີເກົ່າ, ຄອກສັດເກົ່າ, ກອງຂີ້ເຫຼື້ອຍ...
2. ແນວຜັນຕ້ອງເປັນແນວຜັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບ.
3. ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນໍ້າສະອາດ, ບໍ່ມີຄວາມສຽງການປົນ ເປື້ອນຂອງເຊື້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ຄອກສັດ, ແມ່ນໍ້າ ທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວເມືອງໃຫຍ່.
4. ກະສິກໍາທີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນໍ້າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສໍາລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ ໝັກບົ່ມ.
5. ກະສິກໍາທີ່ດີ ອະນຸຍາດນໍ້າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ ບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກໍາກັບການໃຊ້ ຢາ.
6. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດບໍ່ມີຄວາມສຽງການ ປົນເປື້ອນສານພິດຕໍ່ຜົນຜະລິດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄື່ອງ



ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ສູນມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ

030 5472182

ໜ່ວຍງານພັດທະນາກະສິກໍາທີ່ດີ

ບ. ສາມສະອາດ ມ. ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກົມປູກຝັງ

ການປູກຝັງກະລໍ່າປີແບບກະສິກໍາທີ່ດີ



ຈັດພິມໂດຍ:



ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Lao Agriculture Competitiveness Project

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2021

ຜັກກະລໍ່າປີ (Cabbage)



ຕະກູນ : Cruciferae

ຊື່ວິທະຍາສາດ : *Brassica oleracea* L. var. *capitata*

ຊື່ພາສາອັງກິດ : Cabbage

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ເປັນພືດຕະກູນກະລໍ່າ (cruciferae) ເປັນພືດຜັກທີ່ມີຖິ່ນກຳເນີດ

ໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ສາມາດປູກໄດ້ທັງ

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ກະລໍ່າປີເປັນພືດລົ້ມລູກມີລັກສະນະເປັນຫົວກົມ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ

ສະພາບດິນຝ້າອາກາດທີ່ເໝາະສົມ

ກະລໍ່າປີສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີເກືອບດິນທຸກຊະນິດ ແຕ່

ດິນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນດິນຊາຍ ແລະ ດິນໜຽວ ທີ່ມີອິນຊີວັດຖຸ

ສູງ, ຄ່າ PH ຂອງດິນ 6-6.5, ອຸ່ນຫະມູມທີ່ເໝາະສົມ 22-25

ແນວພັນ

ແນວພັນຜັກກະລໍ່າປີ ສາມາດແຍກອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຄື:

1. ພັນທຳມະດາ: ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປູກຫຼາຍທີ່ສຸດ ມີລັກສະນະຫົວຫຼາຍແບບແຕກຕ່າງກັນ ຕັ້ງແຕ່ຫົວກົມ, ຫົວແຫຼມ ເປັນຮູບຫົວໃຈຈົນເຖິງກົມແບນຮາບ ມີສີຂຽວຈົນເຖິງສີຂຽວອ່ອນເປັນພັນທີ່ທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວສິ້ນປະມານ 50-60 ວັນ.

2. ພັນສີແດງ: ມີລັກສະນະຫົວຂ້ອນຂ້າງກົມ ໃບສີແດງ ສ່ວນ

ການກະກຽມດິນ

ການກຽມໜານກຳ

ຊຸດ ຫຼື ໄຖດິນເລິກປະມານ 15-20 ຊມ ຕາກແດດໄວ້ 5-7 ວັນ ຈາກນັ້ນປັ່ນດິນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວຍົກເປັນໜານກວ້າງ ຫຼື ຍາວຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ໃສ່ຝຸ່ນປົ່ມປະສົມກັບດິນໃນໜານ,

ການກະກຽມໜານປູກ

ໄຖດິນເລິກ 15-20 ຊມ ຕາກດິນໄວ້ 5-7 ວັນ ແລ້ວຄາດດິນໃຫ້ລະອຽດ ຊຸດເປັນຊຸມໄລຍະຫ່າງ 40 x 40 ຊມ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກໃນອັດຕາ 200 ກລ/ໄລ່ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີສູດ 15:15:15 ໃນອັດຕາ 40 ກລ/ໄລ່ ຮອງພື້ນໃຫ້ຫຼາຍສົມຄວນເພື່ອປັບສະພາບ

ການປູກ

ເມື່ອເບ້ຍຜັກກະລໍ່າປີ ອາຍຸໄດ້ 25-30 ວັນ ຈຶ່ງຍ້າຍປູກໃນໜານທີ່ກຽມໄວ້ ໂດຍປູກເປັນແຖວຄູໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງປູກ 30-40 x

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຝຸ່ນ: ກະລໍ່າປີເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການທາດໄນໂຕເຈນ ແລະ ໄພແທັສຊຽມສູງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລຳຕົ້ນ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນເຄມີສູດ 15:15:15 ໃສ່ຮອງພື້ນຊຸມກ່ອນປູກ ປະສົມກັບຝຸ່ນຄອກ ຈາກນັ້ນ, ເມື່ອພືດຈະເລີນເຕີບໂຕ

ການໃຫ້ນ້ຳ:

ຄວນໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ.

ການປ້ອງກັນ, ກຳຈັດ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ໃນຜັກກະລໍ່າປີ

- **ພະຍາດເນົ່າເປື້ອຍ:** ພະຍາດນີ້ຈະພົບເຫັນເກືອບທຸກໄລຍະຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແຕ່ມັກພົບເຫັນຫຼາຍໃນໄລຍະຫໍ່ຫົວຈະ
- **ບັງເຈາະຫົວກະລໍ່າ:** ມັກຈະເຈາະເຂົ້າໄປໃນຫົວທີ່ກຳລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຂົ້າໄປໃນລຳຕົ້ນ.

ການປ້ອງກັນ: ຄວນເລືອກເອົາເບ້ຍທີ່ບໍ່ມີໄຂ່ ຫຼື ມີບັງນ້ອຍຕິດມາ