


ການເກັບກ່ຽວ

ສ່ວນຫຼາຍອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງໝາກແຕງກວາປະມານ 30-45 ວັນ ທັງນີ້ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະສາຍພັນ. ການເກັບກ່ຽວແມ່ນເກັບໝາກທີ່ສີຂຽວສົດເກັບທຸກວັນ ແລະ ເກັບຈົນກວ່າໝາກ



ຈັດການກັບຜະລິດຕະພັນຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍບໍ່ໃຫ້ ບວມຊ້າ



ຢ່າໂຍນ, ຢ່າຢຽບຜະລິດຕະພັນ.



❖ ຫຼັກການປະຕິບັດກະສິກໍາທີ່ດີ

1. ພື້ນທີ່ການຜະລິດຕ້ອງບໍ່ມີຄວາມສຽງ ການປົນເປື້ອນຂອງໂລຫະໜັກ, ເຊື້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາເກົ່າ, ສາງເຄມີເກົ່າ, ຄອກສັດເກົ່າ, ກອງຂີ້ເຫຼື້ອຍ...
2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ.
3. ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນໍ້າສະອາດ, ບໍ່ມີຄວາມສຽງການປົນເປື້ອນຂອງເຊື້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ຄອກສັດ, ແມ່ນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວເມືອງໃຫຍ່.
4. ກະສິກໍາທີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຜຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສໍາລັບຜຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການໜັກປື້ມ.
5. ກະສິກໍາທີ່ດີອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກໍາກັບການໃຊ້ຢາ.
6. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດບໍ່ມີຄວາມສຽງການປົນເປື້ອນສານພິດຕໍ່ຜົນຜະລິດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄື່ອງ



ສິນໃຈຕິດຕໍ່

ສູນມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ

030 5472182

ໜ່ວຍງານພັດທະນາກະສິກໍາທີ່ດີ

ບ. ສາມສະອາດ ມ. ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

www.laogapcadc.org

ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກົມປູກຝັງ

ການປູກໝາກແຕງກວາ



ຈັດພິມໂດຍ:



ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Lao Agriculture Competitiveness Project

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2021

ໝາກແຕງກວາ(Cucumber)



ຕະກູນ : Cucumis

ຊື່ວິທະຍາສາດ : *Cucumis sativus* L.

ຊື່ພາສາອັງກິດ : Cucumber

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໝາກແຕງກວາມີຖິ່ນກຳເນີດໃນປະເທດອິນເດຍ ນິຍົມປູກເພື່ອໃຊ້ໝາກເປັນອາຫານມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວ 30-45 ວັນ. ໝາກແຕງກວາ ຫຼື ໝາກແຕງຂີ້ໄກ່ ເປັນພືດຜັກທີ່ໃຊ້

ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ໝາກແຕງກວາເປັນພືດຜັກທີ່ປູກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ເປັນພືດປີດຽວ(Annual), ມີລຳຕົ້ນເປັນເຄືອຍາວປະມານ 1-3 m, ມີເຄືອທາວຂຶ້ນຕາມຄ້າງ, ໂດຍທົ່ວໄປແຕງກວາມີດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ແຍກກັນຢູ່ແຕ່ລະດອກໃນຕົ້ນດຽວກັນ, ອາຍຸການເກັບກ່ຽວ ນັບຕັ້ງແຕ່ຢອດເມັດຫາເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດປະມານ 30-45 ວັນ. ແຕງກວາສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກ

ແນວພັນທີ່ໃຊ້ປູກ

ໝາກແຕງກວາທີ່ໃຊ້ປູກໂດຍທົ່ວໄປຈັດເປັນປະເພດ:

ພັນສຳລັບບໍລິໂພກສົດ: ມີທັງພັນພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນປັບປຸງ, ພັນທີ່ມີເນື້ອໃຫຍ່ ແລະ ມີນ້ຳຫຼາຍສີຂອງເປືອກຂຽວຈາງເວລາໝາກຍັງອ່ອນ ຈະມີໝາກເຕັມໄປໝົດ ເມື່ອໝາກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແລ້ວໝາກກໍ່ລົ່ນອອກ (ມີທັງໝາກສີຂາວ ແລະ ສີດຳ) ສາມາດເອົາມີລູບອອກໄດ້ ໝາກແຕງທີ່ມີໝາກສີຂາວຈະມີຄຸນນະພາບ

ການກຽມດິນໝານປູກ

ຄວນໄຖຂຸດດິນເລິກປະມານ 20-23 cm. ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 4-6 ວັນ ໃສ່ຝຸ່ນປົ່ມທີ່ສະລາຍຕົວໄດ້ດີປະມານ 12 ໂຕນ/ເຮັກຕ້າ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບຂອງດິນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມອຸດົມ

ການປູກ

ຖ້າປູກໝາກແຕງໂດຍບໍ່ເຮັດຄ້າງປ່ອຍໃຫ້ມັນເລືອໄປຕາມດິນໃຊ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ 50 cm. ລະຫວ່າງແຖວ250 cm. ຖ້າປູກໃສ່ຄ້າງໄລຍະຕົ້ນ 50 cm ໄລຍະແຖວ 100 cm, ຫຼັງຈາກກຽມດິນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ຈັດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແລະ ແຖວຕາມທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ຢອດເມັດລົງຊຸມໆລະ 1-2 ເມັດ ເລິກໄປໃນດິນ 2.5 cm, ປົກດ້ວຍຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນປົ່ມ ຫຼື ດິນລະອຽດລົງຊຸມຈົນເຕັມ ຫົດນ້ຳໃຫ້ປຽກປົກດ້ວຍ

ການປັກໄມ້ຄ້າງ

ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 20-22 ວັນ ໝາກແຕງກວາເລີ່ມເລືອຖ້າປູກແບບຄ້າງ ຄວນເຮັດຄ້າງເພື່ອໃຫ້ເຄືອເລືອຂຶ້ນ. ການປັກໄມ້ຄ້າງແມ່ນປັກຫ່າງຈາກຕົ້ນໝາກແຕງປະມານ 5-10 cm ໂຮບປາຍ

ການໃສ່ຝຸ່ນ

ເນື່ອງຈາກໝາກແຕງເປັນພືດທີ່ກິນໝາກຕ້ອງການຝຸ່ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດຝຸ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແນໃສ່ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນດ້ານຜົນຜະລິດ ໂດຍສະເພາະການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງລຳຕົ້ນ, ດອກ ແລະ ໝາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຝຸ່ນສູດ 15:15:15 ໃນອັດຕາ 75 ກລ/ໄລ່ ໂດຍແບ່ງໃສ່ 3 ເທື່ອຄື: ເທື່ອທີ1 ໃສ່ເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນຝຸ່ນຮອງຜື້ນຕອນປູກແລ້ວພວນດິນປົກ, ເທື່ອທີ 2 ໃຫ້ໃສ່ເມື່ອພືດມີອາຍຸປະມານ

ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍແຕ່ຢ່າໃຫ້ປຽກເກີນໄປ ໂດຍເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມ

ການເສຍຫຍ້າ ແລະ ພວນດິນ

ການພວນດິນກຳຈັດຫຍ້າ ຄວນເຮັດໃນໄລຍະທຳອິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນລຸລ່ວງຜູ້ຜຸຍ ສາມາດລະບາຍອາກາດ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ ພ້ອມກັບການກຳຈັດຫຍ້າໄປພ້ອມໆກັນ.