

ໜອນເຈາະລຳຕົ້ນສາລີ: ໂຕເຕັມທີ່ເປັນແມງກະເບື້ອກາງຄືນວາງໄຂ່ຊ້ອນ
ກັນຄ້າຍຄືເກັດປາ ເມື່ອແຕກເປັນຕົວໜອນຈະເລີ່ມທຳລາຍຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ
20 ວັນ ເຖິງໄລຍະເຕັມໄວ ຈະທຳລາຍລຳຕົ້ນ ແລະ ສ່ວນຍອດຊຸ່ດອກ
ຕົວຜູ້ ເຮັດໃຫ້ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຫັກລົ້ມງ່າຍ ເມື່ອມີການ

ການປ້ອງກັນກຳຈັດ: ຄວນສຳຫຼວດເບິ່ງການທຳລາຍຂອງໜອນ ໂດຍ
ສັງເກດເບິ່ງສ່ວນໃບ ແລະ ລຳຕົ້ນ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໂດຍສະເພາະສາລີ
ທີ່ມີອາຍຸ 20-45 ວັນ ຖ້າຫາກພົບເຫັນການທຳລາຍຄວນຫາວິທີປ້ອງ

ການເກັບກ່ຽວສາລີຫວານ

ສາລີຫວານແຕ່ລະຜັນມີອາຍຸເກັບກ່ຽວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍທົ່ວໄປຈະ
ມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະມານ 70-75 ວັນ, ການເກັບກ່ຽວສາລີຈະສັງ
ເກດເບິ່ງໄໝສາລີເລີ່ມເປັນສີນ້ຳຕານ 50% ໃນຜືນທີ່ປູກ ກໍ່ສາມາດ
ເກັບກ່ຽວໄດ້ ຫຼື ຈະນັບແຕ່ມື້ອອກໄໝຮອດ 20 ວັນ ກໍ່ສາມາດເກັບ

➤ ຫຼັກການປະຕິບັດກະສິກຳທີ່ດີ

1. ຜືນທີ່ການຜະລິດຕ້ອງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປື້ອນຂອງໂລຫະ
ໜັກ, ເຊື້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັ່ນ: ຜືນທີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ
ກຳເກົ່າ, ສາງເຄມີເກົ່າ, ຄອກສັດເກົ່າ, ກອງຂີ້ເຫຼື້ອຍ...
2. ແນວຜັນຕ້ອງເປັນແນວຜັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖືກ
ຕ້ອງຕາມລະບຽບ.
3. ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປົນ
ເປື້ອນຂອງເຊື້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ້ຳ
ທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວເມືອງໃຫຍ່.
4. ກະສິກຳທີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຜຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສຳລັບຜຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ
ໝັກປື້ມ.
5. ກະສິກຳທີ່ດີອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ
ບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກຳກັບການໃຊ້
ຢາ.
6. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການ
ປົນເປື້ອນສານພິດຕໍ່ຜົນຜະລິດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສ່ວນ, ເຄື່ອງ

**ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກົມປູກຝັງ**

ການປູກສາລີຫວານແບບກະສິກຳທີ່ດີ



ສິນໃຈຕິດຕໍ່
ສູນມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ
030 5472182
ໜ່ວຍງານພັດທະນາກະສິກຳທີ່ດີ

ຈັດພິມໂດຍ:



ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Lao Agriculture Competitiveness Project

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2021

ສາລີຫວານ (Sweet corn)



ຕະກູນ : *Zea*

ຊື່ວິທະຍາສາດ : *Zea mays* Linn.

ຊື່ພາສາອັງກິດ : Sweet corn

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສາລີຫວານຈັດຢູ່ໃນພືດລີ້ມລູກຕະກູນດຽວກັບຫຍ້າ, ສາລີມີຖິ່ນກຳເນີດທີ່ທະວີບອາເມຣິກາກາງ ເຊັ່ນ: ປະເທດເມັກຊິໂກ ຈາກນັ້ນກໍມີການຂະຫຍາຍໄປຍັງທະວີບຢູໂຣບ. ປັດຈຸບັນສາລີຫວານ ນອກຈາກເປັນພືດທີ່ຄົນເຮົານິຍົມບໍລິໂພກ ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການອາຫານສູງແລ້ວ ສາລີຍັງມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສາມາດ

ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງສາລີ

ສາລີຫວານເປັນສາລີທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ຮັບປະທານຫຼາຍກວ່າການແປຮູບ, ຈະມີເມັດໃສ ແລະ ໜຽວ ເມື່ອແກ່ເຕັມທີ່, ມີທາດນ້ຳຕານຫຼາຍ, ກ່ອນທີ່ຈະສຸກແກ່ ຈະມີລິດຊາດຫວານກວ່າຊະນິດອື່ນໆ ຍ້ອນແນວນັ້ນຜູ້ຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນວ່າ: ສາລີຫວານ, ເມື່ອສາລີຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ປະມານ 7-10 ວັນ ຮາກຖາວອນຈະງອກຂຶ້ນອ້ອມຮອບ ແລະ ມີປ້ອງຫ່າງຈາກໜ້າດິນປະມານ 1-2 ນິ້ວ ແລະ ມີລຳຕົ້ນສູງປະມານ 2-2,5 ແມັດ. ສາລີມີໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຄື: ເລີ່ມງອກໃຊ້ເວລາ

ແນວພັນທີ່ໃຊ້ໃນການປູກ:

ພັນທີ່ໃຊ້ໃນການປູກແມ່ນພັນ High big ເປັນພັນປັບປຸງລູກປະສົມ, ເປັນພັນທົນທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 2-2,5 ໂຕນ

ສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ

ສະພາບພື້ນທີ່

- ສາມາດປູກໄດ້ທຸກພື້ນທີ່ທີ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດ.
- ເປັນພື້ນທີ່ຮາບພຽງສະໜ້າສະເໝີມີຄວາມຄ່ອຍຊັນບໍ່ເກີນ 5%.

ລັກສະນະດິນ

- ເປັນດິນຮ່ວນ, ດິນໜຽວປົນຊາຍ ຫຼື ດິນຮ່ວນປົນຊາຍ.
- ເປັນດິນລະບາຍນ້ຳ ແລະ ຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ.
- ຄວາມເປັນກົດເປັນຕ່າງຢູ່ລະຫວ່າງ 5.5-6.8

ການກຽມດິນ

ການປູກ

ກ່ອນປູກທຸກຄັ້ງ ຄວນແຊ່ເມັດພັນດ້ວຍສານເຄມີປ້ອງກັນພະຍາດຕາມຄຳແນະນຳຂອງສະຫຼາກຂ້າງຊອງເມັດພັນ, ຢອດໜຶ່ງເມັດຕໍ່ຊຸມໄລຍະຫ່າງຊຸມຕໍ່ຊຸມ 30 ຊຸມ ໃຊ້ເມັດພັນ 1-1,5 ກິໂລ/ໄລ່ ຖ້າເມັດພັນມີຄວາມງອກຕໍ່າກວ່າ 85 % ໃຫ້ຢອດ 1-2 ເມັດ/ຊຸມ ແລະ ໃຊ້ເມັດ

ການບົວລະບັດຮັກສາ

ການໃສ່ຜຸນ:

ກ່ອນປູກຄວນຮອງຜືນດ້ວຍຜຸນຄອກເຊັ່ນ: ຜຸນບົ່ມຂີ້ໄກ່ ໃນອັດຕາ 150-200 ກລ/ໄລ່ ຫຼື ຜຸນເຄມີສຸດ 15-15-15 ຫວ່ານ ແລ້ວຄາດປົກໃນອັດຕາ 30-50 ກລ/ໄລ່ ຂຶ້ນກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ. ຈາກນັ້ນໃສ່ຜຸນສຸດ 46-00-00 ໃສ່ 2 ຄັ້ງຄື: ເມື່ອສາລີອາຍຸໄດ້ 20-25 ວັນ ຫວ່ານຕາມຮ່ອງ ໃນອັດຕາ 25 ກລ/ໄລ່ ແລ້ວຊ່ວນດິນປົກເປັນການເສຍຫຍ້າອະນາໄມແປງໄປຜ່ອມ ແລະ ສາລີອາຍຸໄດ້ 35-40 ວັນ ໃສ່ອີກຄັ້ງ 15 ກລ/ໄລ່. ຖ້າຫາກປູກສາລີຫວານໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງ

ການໃຫ້ນ້ຳ

ການໃຫ້ນ້ຳ ຈະໃຫ້ແບບຝົນທຽມ ຫຼື ແບບຮ່ອງກໍ່ໄດ້ ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂສະດວກຂອງອຸປະກອນທີ່ມີ. ໃນແຕ່ລະໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສາລີ ການໃຫ້ນ້ຳຕ້ອງເບິ່ງລັກສະນະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ຖ້າຫາກເປັນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສູງ ຄວນໃຫ້ນ້ຳ 5-7 ວັນ/ຄັ້ງ ຖ້າເປັນດິນຮ່ວນປົນຊາຍ ຫຼື ດິນຊາຍຄວນໃຫ້ນ້ຳ 3-4 ວັນ/ຄັ້ງ, ແຕ່ລະ

ພະຍາດສັດຕູຜູ້ຂອງສາລີຫວານ

ພະຍາດລາສະຫນົມ: ເມື່ອສາລີອາຍຸໄດ້ 35-40 ວັນ ໃນລະດູຝົນບາງພື້ນທີ່ຈະມັກເກີດລະບາດຮ້າຍແຮງ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ ໂດຍໃຊ້ຢາຊື່ສາມັນຄື: ໄດຟິໂນໂຄນາໂຊ 20 ຊີຊີຕໍ່ນ້ຳ 20 ລິດ